

## **Tájékoztató az ITCAN 270-SL dohány kacsógátló szer felhasználásához**

A DOFER ZRt. 2015-ben szükséghelyzeti engedélykérelmet adott be és 120 napos engedélyt kapott az ITCAN 270-SL (270 g/l maleinsav hidrazid) tartalmú növekedésszabályozó készítmény felhasználására dohány kultúrában kacsógátlás céljára.

A készítményt kizárólag a megyei NÉBIH megyei hivataloknál előzetesen regisztrált termelők használhatják fel. A regisztráció során meg kell adni a felhasználás helyének táblaszintű adatait (település, blokkazonosító és területnagyság). A szer felhasználásának körülményeit, a felhasznált mennyiségeket, annak naprakész dokumentálását a hivatal ellenőrizheti. A szerfelhasználásról és a megmaradt készletekről a forgalmazó FARMMIX. Kft. (4220.Hajdúböszörmény. Ipartelep.u.20.) október 31-ig elszámolást fog benyújtani a megyei hivatalok felé a DOFER ZRt. által megadott termelői felhasználás adatok alapján.

A szer maximálisan engedélyezett felhasználási dózisa 9,0 l/ha. **Ezúton is felhívjuk a Tisztelt Termelők figyelmét, hogy a szermaradvány értékek túllépésének elkerülése érdekében tilos a hektáronkénti maximális dózis túllépése!** A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! Az üres göngyölegeket a felhasználást követően a FARMMIX Kft. telephelyére szükséges visszajuttatni, melynek megszervezésében a DOFER ZRt. területileg illetékes kollégáink segítséget nyújtanak.

### **Felhasználás módja:**

A készítmény a regisztrált dohánytermesztők saját felelősségére, dohány kacsógátlására használható fel a tetejezést követő időszakban egy alkalommal 8,5-9,0 l/ha dózisban 600-800 l/ha permetlével kijuttatva. A szisztemikus hatású készítmény a növénybe felszívódva gátolja a sejtosztódást, különösen a hónaljajtások sejtjeinek fejlődését, ezáltal a kacsok növekedését.

A készítmény kijuttatható szántóföldi permetező géppel, vagy hāti géppel. A permetezést finom porlasztással kell elvégezni. A permetlé csak a növény felső 1/3 – 1/2 részével érintkezzen. A kezeléskor a kacsok hossza ne haladja meg az 1,0-1,5 cm méretet. Az ennél nagyobb kacsokat kézzel, vagy kontakt hatású kacsógátló szerrel szükséges eltávolítani. Az ITCAN 270-SL kijuttatásakor a betakarításra szánt levelek hosszúsága legalább 15-20 cm legyen.

Általános technológiai javaslatként a kezelést a kontakt hatású *n-dekanol* hatóanyagú kacsógátló készítmény (Royaltac, ANTAK) alkalmazását követő 7-10 nap elteltével, záró kezelésként célszerű elvégezni. Amennyiben a területen nem volt kontakt hatású szerrel történő első kezelés, vagy az a tetejezést megelőzően történt, az ITCAN 270-SL kacsógátló szert a tetejezést követően, legkésőbb 24 órán belül

javasolt kiszórni. A virágzás kezdete előtti kijuttatás nem ajánlott, mert a készítmény gátolja a fiatal levelek teljes kifejlődését.

A kijuttatást a reggeli órákban végezzük a harmat felszáradása után. Nagy melegben, 25°C felett nem ajánlott a permetezés. A készítményt egyéb növényvédő szerekkel ne keverjük. Esőt és öntözést követően a felhasználás 48 óra elteltével javasolt. Amennyiben a kijuttatást követő 6-8 órán belül olyan intenzitású csapadék hullik a kezelt területre, ami a felszívódást megelőzően lemossa a levelekről a kacsgátló szert, úgy a termelő - a DOFER ZRt. területileg illetékes munkatársának előzetes értesítését és jóváhagyását követően-, maximum fél dózissal megismételheti a kezelést. Az ilyen esetekről jegyzőkönyvet szükséges felvenni.

**A maximálisan megengedett 80 mg/kg szermaradék határérték túllépésének elkerülése érdekében a kezelt táblában a dohánylevelek betakarítását csak a kezelést követő 10 nap elteltével szabad megkezdeni!** A szermaradék értékek bevizsgálata céljából a DOFER ZRt. munkatársai mintákat vesznek. A határértéknél magasabb hatóanyag koncentrációt tartalmazó dohánytétételek átvételét a cég megtagadhatja.

A készítmény kedvező hatással van a dohányszádor (*Orobanche spp.*) elleni megelőző védekezésekhez.

Szolnok, 2015. július 7.

Pomázi István  
Vezérigazgató  
DOFER ZRt.