

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Kreglinger Europe NV** (Grote Markt 7, 2000 Antwerpen, Belgium) ügyfél kérelmére az **Itcan SL 270 növekedésszabályozó készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság az **Itcan SL 270 növekedésszabályozó készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6300/3126-1/2021 **NÉBIH** számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

módosítja:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

Kultúra	Cél	Dózis (l/ha)	Víz mennyiség (l/ha)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
dohány	kacsgátlás	11,0-12,1	500-600	tetejezés után
burgonya	kihajtásgátlás	11	300-600	az első virágzatok elnyílása – az első virágzat bogyói aszottak, sötét színűek (BBCH 69-89)
vöröshagyma	kihajtásgátlás	8,9	500-600	10-30% dőlés, ill. 20-50% levélsárgulás (a levélsúcsok még zöldek) BBCH 47-48 2-3 héttel betakarítás előtt
Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009 EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.				
fokhagyma, mogyoróhagyma	kihajtásgátlás	8,9	500-600	10-30% dőlés, ill. 20-50% levélsárgulás (a levélsúcsok még zöldek) BBCH 47-48 2-3 héttel betakarítás előtt

Előírt növényvédelmi technológia

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítményt tilos dughagymában, illetve vetőburgonyában alkalmazni!

A készítmény készítésekor habzástgátló adalékanyag használata szükséges!

Dohányban a készítményt tetejezés után 11,0-12,1 l/ha dózisban 500-600 l/ha permetlé mennyiséggel kell az állományra permetezni a rügyek vegyszeres eltávolítása céljából. A permetezés közvetlenül történjen az egészséges növények száraz levélzetére, finom cseppek formájában, hogy elfedje minden egyes növény felső felét. Az utolsó leszedhető levelek legalább 15-20 cm-esek legyenek a készítmény alkalmazásakor.

Vöröshagymában és burgonyában a készítmény a tárolás megkezdése után 3-6 hónapon át gátolja a gumók kihajtását. A hatástartam a tárolás módjától és a dózistól függ.

Burgonyában a készítmény az első virágzatok elnyílásától az első virágzat bogyóinak éréséig (a bogyók aszottak, sötét színűek) juttatható ki 11 l/ha dózisban. A kezelést a természetes levélsárgulás előtt kell elvégezni és a kezelés időpontjában a gumók minimum 80 %-ának el kell érnie a 25 mm-es gumóméretet. A korábbi kezelés terméseszköket eredményezhet!

Vöröshagymában a készítményt a hagyma tervezett felszedése előtt 2-3 héttel, 10-30 %-os szárdöléskor és még részben zöld levéllel rendelkező, 20-50%-os sárgulásban lévő növényállományban kell kijuttatni 8,9 l/ha dózisban.

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, a kezelt hagyma renden szárítása a biológiai hatás szempontjából előnyös.

A készítmény csak ép, egészséges (betegségtől, parazitától vagy az éghajlati feltételek okozta víz stressztől mentes) és száraz növényállományban juttatható ki.

A permetezést hűvös időben kell elvégezni. A hőmérséklet nem haladhatja meg a 25°C-ot legalább 50% relatív páratartalom mellett.

Kiskultúrás felhasználások a felhasználó saját felelősségére a 1107/2009/EK rendelet 51. cikk alapján:

Fokhagyma és mogyoróhagyma kultúrákban a készítményt a hagyma tervezett felszedése előtt 2-3 héttel, 10-30 %-os szárdöléskor és még részben zöld levéllel rendelkező, 20-50%-os sárgulásban lévő növényállományban kell kijuttatni 8,9 l/ha dózisban.

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, a kezelt hagyma renden szárítása a biológiai hatás szempontjából előnyös.

A készítmény csak ép, egészséges (betegségtől, parazitától vagy az éghajlati feltételek okozta víz stressztől mentes) és száraz növényállományban juttatható ki.

A permetezést hűvös időben kell elvégezni. A hőmérséklet nem haladhatja meg a 25°C-ot legalább 50% relatív páratartalom mellett.

Hatásmechanizmus:

A malein-hidrazid szisztémikus hatású növekedésszabályozó hatóanyag.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

A módosításnak megfelelő termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedélyezési eljárás díja 440 000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

Az ügyfél 2024. május 7. napján benyújtott kérelmében az **Iscan SL 270 növekedésszabályozó készítmény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében a dohány kultúrában előírt dózis módosítását kérte a hatóságtól.

A növényvédő szerek engedélyezésének közösségi szabályairól a *növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117 EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről* szóló 1107/2009/EK rendelet (továbbiakban: EK Rendelet) rendelkezik.

Az ügyfél az engedélyokirat módosításához 3 db dohány kultúrában beállított kisparcellás vizsgálatot nyújtott be. Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem benyújtása megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az ügyfél 2025. december 31-ig 1 db pótlólagos kísérlet benyújtására kötelezett, amelyben vizsgálják az Iscan SL 270 növekedésszabályozó készítmény 8,33 l/ha-os, 11,0 l/ha-os, 12,1 l/ha-os és 16,7 l/ha-os dózisát. Amennyiben a fent említett határidőig nem kerül benyújtásra a kísérlet a készítmény jelenlegi módosítása visszavonásra kerül.

Az engedélyező hatóság az EK Rendelet 45. cikke, valamint a *növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról* szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendeletnek (a továbbiakban: R.) az eljárásra vonatkozó részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az *EK rendelet 31. cikk (2) bekezdésén*, a *65. cikkén*, valamint az *1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról* szóló 547/2011/EU rendeleten alapul.

Az engedélyezési eljárási díjat a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal*, valamint a *megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei* előtt kezdeményezett eljárásokban *fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről*, valamint az *igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól* szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 8.2.2.5., 8.2.2.7., 8.2.2.8., 8.2.2.9., 8.2.2.10., 8.2.2.11. és 8.11. pontja alapján állapította meg az engedélyező hatóság.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról* szóló 22/2012 (II.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a *földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) megfelelően hozta.

A jogorvoslat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja, 18. § (1) bekezdés alapján biztosított.

Budapest, 2025. május 19.

Dr. Nemes Imre Zoltán
elnök nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél meghatalmazott útján értesül
2. Irattár

(276/2025)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|---|--|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 6300/3126-1/2021 NÉBIH |
| 1.2. Növényvédő szer neve: | Itcan SL 270 |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2033. október 31. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Kreglinger Europe NV
(Grote Markt 7, 2000 Antwerpen, Belgium) |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | - |

2. A növényvédő szer adatai:

- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| 2.1. Növényvédő szer gyártója: | Drexel Chemical Company
1700 Channel Avenue, P.O. Box 13327 Memphis,
TN38113-0327, USA | |
| 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: | növekedésszabályozó készítmény | |
| 2.3. Növényvédő szer formulációja: | folyékony vízzoldható koncentrátum (SL) | |
| 2.4. Növényvédő szer összetétele: | | |
| 2.4.1. hatóanyag | hatóanyag sója | |
| ISO név | maleinsav-hidrazid | maleinsav-hidrazid kálium só |
| CAS szám | 123-33-1 | 28382-15-2 |
| IUPAC név | 6-hidroxi-2H-piridazin-3-on | 6-hidroxi-2H-piridazin-3-on kálium sója |
| tiszta hatóanyag részaránya | 270 g/l | 360 g/l |

3. Minőségi követelmények:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 3.1. Hatóanyag tartalom | |
| 3.1.1. maleinsav-hidrazid (HPLC-UV) | 22,7 ± 1,1 % (m/m) |
| 3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: | Meg kell felelnie az SL formuláció FAO követelményeinek. |

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: sárga színű, átlátszó, szagtalan folyadék
pH (1%-os hígítás, 20°C): 7,49
Relatív sűrűség (21°C): 1,19
Felületi feszültség (44 g/l-es oldat): 24,78 mN/m
Dinamikai viszkozitás (20°C): 10,78-15,28 mPa.s

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Cél	Dózis (l/ha)	Vízmenyiség (l/ha)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
dohány	kacsgátlás	11,0-12,1	500-600	tetejezés után
burgonya	kihajtásgátlás	11	300-600	az első virágzatok elnyílása – az első virágzat bogyói aszottak, sötét színűek (BBCH 69-89)
vöröshagyma	kihajtásgátlás	8,9	500-600	10-30% dőlés, ill. 20-50% levélsárgulás (a levélcúcsok még zöldek) BBCH 47-48 2-3 héttel betakarítás előtt
Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009 EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.				
fokhagyma, mogyoróhagyma	kihajtásgátlás	8,9	500-600	10-30% dőlés, ill. 20-50% levélsárgulás (a levélcúcsok még zöldek) BBCH 47-48 2-3 héttel betakarítás előtt

Előírt növényvédelmi technológia

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítményt tilos dughagymában, illetve vetőburgonyában alkalmazni!

A készítmény készítésekor habzásgátló adalékanyag használata szükséges!

Dohányban a készítményt tetejezés után 11,0-12,1 l/ha dózisban 500-600 l/ha permetlé mennyiséggel kell az állományra permetezni a rügyek vegyszeres eltávolítása céljából. A permetezés közvetlenül történjen az egészséges növények száraz levélzetére, finom cseppek formájában, hogy elfedje minden egyes növény felső felét. Az utolsó leszedhető levelek legalább 15-20 cm-esek legyenek a készítmény alkalmazásakor.

Vöröshagymában és burgonyában a készítmény a tárolás megkezdése után 3-6 hónapon át gátolja a gumók kihajtását. A hatástartam a tárolás módjától és a dózistól függ.

Burgonyában a készítmény az első virágzatok elnyílásától az első virágzat bogyoinak éréséig (a bogyók aszottak, sötét színűek) juttatható ki 11 l/ha dózisban. A kezelést a természetes levélsárgulás előtt kell elvégezni és a kezelés időpontjában a gumók minimum 80 %-ának el kell érnie a 25 mm-es gumóméretet. A korábbi kezelés termésnövekedést eredményezhet!

Vöröshagymában a készítményt a hagyma tervezett felszedése előtt 2-3 héttel, 10-30 %-os szárdőléskor és még részben zöld levéllel rendelkező, 20-50%-os sárgulásban lévő növényállományban kell kijuttatni 8,9 l/ha dózisban.

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, a kezelt hagyma renden szárítása a biológiai hatás szempontjából előnyös.

A készítmény csak ép, egészséges (betegségtől, parazitától vagy az éghajlati feltételek okozta víz stressztől mentes) és száraz növényállományban juttatható ki.

A permetezést hűvös időben kell elvégezni. A hőmérséklet nem haladhatja meg a 25°C-ot legalább 50% relatív páratartalom mellett.

Kiskultúrás felhasználások a felhasználó saját felelősségére a 1107/2009/EK rendelet 51. cikk alapján:

Fokhagyma és mogoróhagyma kultúrákban a készítményt a hagyma tervezett felszedése előtt 2-3 héttel, 10-30 %-os szárdőléskor és még részben zöld levéllel rendelkező, 20-50%-os sárgulásban lévő növényállományban kell kijuttatni 8,9 l/ha dózisban.

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, a kezelt hagyma renden szárítása a biológiai hatás szempontjából előnyös.

A készítmény csak ép, egészséges (betegségtől, parazitától vagy az éghajlati feltételek okozta víz stressztől mentes) és száraz növényállományban juttatható ki.

A permetezést hűvös időben kell elvégezni. A hőmérséklet nem haladhatja meg a 25°C-ot legalább 50% relatív páratartalom mellett.

Hatásmechanizmus:

A malein-hidrazid szisztemikus hatású növekedésszabályozó hatóanyag.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre, való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): ≥2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján:* nem jelölésköteles

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:* nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

Tűzveszélyességi besorolás:**nem jelölésköteles****5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:****GHS Piktogram:**

-

Figyelmeztetés:

-

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:**H412** Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:****P102** Gyermekektől elzárva tartandó.**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.**P280** Védőkesztyű használata kötelező.**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.**Kiegészítő veszélyességi információ:****EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.**EUH208** Benzizotiazolinont (CAS szám: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.**5.2 Különleges S-mondatok:****SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!**SPe2** A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, $K_A < 30$), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!**SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepterület) biztonsági övezetet!**5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:**

A nem-cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.4. Várakozási idők**5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap (száradásig)**5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:**

Kultúra	Várakozási idő (nap)
Dohány	7
Burgonya	21
Vöröshagyma	4
Fokhagyma, mogoróhagyma	4

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos kabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti-megfigyelőkezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszerezés, csomagolás

6.1. A kiszerezés térfogata/tömege:	5 liter, 15 liter, 20 liter, 200 liter, 300 liter, 600 liter, 1000 liter
6.2. A csomagolóanyag anyaga:	HDPE

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait száraz, hűvös helyen történő tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 2 év

8. Forgalmazási kategória:

II.

Budapest, 2025. május 19.

Dr. Nemes Imre Zoltán
elnök nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.